
AMC 10

하프 모의고사

제 7 회

해설

정답표 • 출처 • 단계별 풀이

정답표와 출처

번호	정답	출처	영역
1	C	2015 AMC 10B 10번	정수론
2	B	2008 AMC 10B 11번	대수
3	C	2004 AMC 10A 12번	경우의 수와 확률
4	C	2009 AMC 10B 13번	기하
5	C	2014 AMC 10A 15번	대수
6	B	2017 AMC 10A 16번	정수론
7	D	2016 AMC 10B 17번	기하
8	D	2009 AMC 10A 18번	대수
9	E	2016 AMC 10A 19번	기하
10	D	2011 AMC 10A 20번	경우의 수와 확률

1 정수론

출처: 2015 AMC 10B 10번

–2015보다 큰 모든 음의 홀수의 곱의 부호와 일의 자리 숫자는?

- (A) 일의 자리 숫자가 1인 음수이다. (B) 일의 자리 숫자가 1인 양수이다.
 (C) 일의 자리 숫자가 5인 음수이다. (D) 일의 자리 숫자가 5인 양수이다.
 (E) 일의 자리 숫자가 0인 음수이다.

핵심 아이디어. 부호와 일의 자리 숫자를 따로 정해 봅시다. 부호는 음수인 인수가 몇 개인지에만 달려 있고, 일의 자리 숫자는 인수 5와 인수 2가 나타나는지를 따져 보면 정해집니다.

부호. 곱하는 수는 $-1, -3, -5, \dots, -2013$ 입니다(“보다 큰”이라고 했으므로 -2015 자신은 빠집니다). 이들의 절댓값 $1, 3, \dots, 2013$ 은 2013 이하의 홀수이고, 그 개수는 $\frac{2013+1}{2} = 1007$ 입니다. 음수인 인수가 홀수 개이므로 곱은 음수입니다.

일의 자리 숫자. 인수 -5 가 들어 있으므로 곱은 5의 배수이고, 일의 자리 숫자는 0 또는 5입니다. 모든 인수가 홀수이므로 곱도 홀수이고, 일의 자리 숫자가 0일 수는 없습니다. 따라서 일의 자리 숫자는 5입니다.

주의. “보다 큰”을 “이상”으로 읽으면 -2015 가 더해져 인수가 1008개, 즉 짝수 개가 됩니다. 그러면 일의 자리 숫자가 5인 양수, 선택지 (D)가 나옵니다. 또 “5의 배수”라는 사실만으로 “일의 자리 숫자가 0”이 되는 것은 아닙니다. 짝수인 인수가 없으면 일의 자리 숫자는 반드시 5이므로 (E)는 답이 아닙니다.

정답: (C) 음수, 일의 자리 숫자 5

2 대수

출처: 2008 AMC 10B 11번

실수로 이루어진 수열 (u_n) 이 $u_{n+2} = 2u_{n+1} + u_n$ 을 만족하고 $u_3 = 9$, $u_6 = 128$ 일 때, u_5 의 값은?

- (A) 40 (B) 53 (C) 68 (D) 88 (E) 104

핵심 아이디어. 알려진 두 항 u_3 과 u_6 은 세 단계 떨어져 있고, 그 사이의 u_4 와 u_5 가 빠져 있습니다. 빠진 첫 항 u_4 를 미지수로 두고 다음 항들을 그것으로 나타내면, $u_6 = 128$ 이라는 값에서 방정식 하나를 얻습니다.

1단계. $u_4 = x$ 라 합시다. 주어진 관계식에 $n = 3$ 을 대입하면

$$u_5 = 2u_4 + u_3 = 2x + 9.$$

2단계. 다시 $n = 4$ 를 대입하면

$$u_6 = 2u_5 + u_4 = 2(2x + 9) + x = 5x + 18.$$

3단계. $u_6 = 128$ 이므로 $5x + 18 = 128$ 이고, $5x = 110$, $x = 22$ 입니다. 즉 $u_4 = 22$ 입니다.

4단계. 따라서 $u_5 = 2 \cdot 22 + 9 = 44 + 9 = 53$ 입니다.

검산: $u_6 = 2 \cdot 53 + 22 = 106 + 22 = 128$ 입니다. ✓

u_1 이나 u_2 는 전혀 필요하지 않았다는 점에 주목합니다. 점화식은 서로 이웃한 항끼리만 연결하므로, u_3 과 u_6 사이의 구간만 중요합니다.

주의. x 를 구하면 u_5 가 아니라 u_4 에 대한 답을 얻은 것입니다. $x = 22$ (선택지에 없음)에서 멈췄다면 한 단계 더 가라는 신호입니다.

정답: (B) 53

3 경우의 수와 확률

출처: 2004 AMC 10A 12번

헨리스 햄버거 헤븐에서는 햄버거에 다음 토핑을 넣을 수 있다: 케첩, 머스터드, 마요네즈, 토마토, 양상추, 피클, 치즈, 양파. 손님은 고기 패티를 한 장, 두 장, 세 장 중에서 고를 수 있고, 토핑은 어떤 조합이든 고를 수 있다. 주문할 수 있는 햄버거는 모두 몇 가지인가?

- (A) 24 (B) 256 (C) 768 (D) 40,320 (E) 120,960

핵심 아이디어. 햄버거 하나는 토핑마다 넣을지 말지를 정하는 서로 독립인 예/아니오 결정들과 패티 수의 선택으로 정해집니다. 독립인 선택의 가짓수는 곱합니다.

1단계: 토핑. 토핑 8가지를 차례로 보며 각각 버거에 넣을지 말지 정합니다. 토핑마다 선택지가 2가지이고 각 결정은 서로 영향을 주지 않으므로, 토핑 조합의 수는 다음과 같습니다.

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^8 = 256.$$

이 개수에는 빈 조합(아무 토핑도 넣지 않은 버거)도 들어 있으며, 이것도 허용됩니다. “어떤 조합이든”은 아무것도 고르지 않는 경우까지 포함합니다.

2단계: 패티. 이 256가지 조합 각각에 대해 손님은 패티를 1장, 2장, 3장 중에서 고릅니다. 선택지는 3가지입니다.

3단계. 서로 다른 햄버거의 총 가짓수는 다음과 같습니다.

$$3 \times 256 = 768.$$

여기서는 순서가 상관없습니다. 케첩 다음에 머스터드를 넣은 버거와 머스터드 다음에 케첩을 넣은 버거는 같은 버거입니다. 그래서 배열이 아니라 **부분집합**(2^8)을 셉니다.


주의. 토핑을 넣는 순서까지 세면 $8! = 40,320$, 선택지 (D)가 나오고, 여기에 3을 곱하면 120,960, 선택지 (E)가 나옵니다. 하지만 버거는 토핑의 순서가 아니라 토핑의 집합입니다. 패티를 잊으면 256, 선택지 (B)가 남습니다.

정답: (C) 768

4 기하

출처: 2009 AMC 10B 13번

아래 그림과 같이 볼록오각형 $ABCDE$ 의 변의 길이는 $AB = 3$, $BC = 4$, $CD = 6$, $DE = 3$, $EA = 7$ 이다. 처음에 이 오각형은 꼭짓점 A 가 원점에, 꼭짓점 B 가 x 축의 양의 부분 위에 오도록 평면에 놓여 있다. 이 오각형을 x 축을 따라 오른쪽으로 시계 방향으로 굴린다. x 축 위의 점 $x = 2009$ 에 닿는 변은?



- (A) $\overline{AB}$ (B) $\overline{BC}$ (C) $\overline{CD}$ (D) $\overline{DE}$ (E) $\overline{EA}$

핵심 아이디어. 다각형이 미끄러지지 않고 구르면 각 변이 차례로 축 위에 놓게 되므로, 축에 닿는 점들은 변의 길이를 차례로 더해 얻습니다. 2009는 손으로 굴려 보기에는 너무 큰 수입니다. 주기(둘레)를 찾고 나머지로 계산하라는 신호입니다.

1단계: 변의 순서. 처음에 $\overline{AB}$ 는 $[0, 3]$ 을 덮습니다. 시계 방향으로 굴리면 오각형이 B 를 중심으로 회전하므로 다음에 C 가 내려오고, $\overline{BC}$ 가 다음으로 축에 닿는 변이 됩니다. 그다음은 $\overline{CD}$, $\overline{DE}$, $\overline{EA}$ 이고, 그 뒤 다시 $\overline{AB}$ 입니다.

2단계: 한 바퀴. 둘레는 $3 + 4 + 6 + 3 + 7 = 23$ 입니다. 한 바퀴를 완전히 돌 때마다 꼭짓점 A 는 23만큼 더 오른쪽에서 다시 축에 닿으므로, $0, 23, 46, \dots$ 에 놓입니다.

3단계: 2009 줄이기. $23 \times 87 = 2001$ 이므로 $2009 = 2001 + 8$ 입니다. 따라서 87바퀴를 돈 뒤 A 는 $x = 2001$ 에 있고, 그보다 8만큼 더 간 점을 어느 변이 덮는지 알면 됩니다.

4단계: 나머지 따라가기. A 에서 출발하면 각 변이 덮는 구간은 다음과 같습니다.

$$\overline{AB} : [0, 3], \quad \overline{BC} : [3, 7], \quad \overline{CD} : [7, 13].$$

8은 $[7, 13]$ 의 내부(양 끝 제외)에 있으므로 변 $\overline{CD}$ 가 이 점을 덮습니다. 실제 좌표로는 C 가 2008에, D 가 2014에 놓이고, $2008 < 2009 < 2014$ 입니다.

주의. 변의 길이가 서로 다르므로 변의 개수만 세어서는 안 됩니다. 2009를 5로 나눈 나머지(4)를 구해 네 번째 변을 고르면 $\overline{DE}$, 선택지 (D)가 나오는데, 이는 틀린 답입니다. 한 번에 나아가는 양은 변 하나가 아니라 변의 길이이기 때문입니다.

정답: (C) $\overline{CD}$

5 대수

출처: 2014 AMC 10A 15번

데이비드는 비행기를 타기 위해 집에서 공항까지 차를 몰고 간다. 처음 한 시간 동안 35마일을 달렸는데, 이 속력으로 계속 가면 1시간 늦는다는 것을 깨달았다. 그래서 공항까지 남은 거리는 속력을 시속 15마일 높여 달렸고, 30분 일찍 도착했다. 집에서 공항까지의 거리는 몇 마일인가?

- (A) 140 (B) 175 (C) 210 (D) 245 (E) 280

핵심 아이디어. 두 상황은 같은 여정, 같은 마감 시각을 다룹니다. 거리 d 로 각 경우의 이동 시간을 나타내 봅시다. “1시간 늦음”과 “30분 일찍”으로부터 두 이동 시간의 차가 정확히 얼마인지 알 수 있습니다.

1단계: 느린 계획. 시속 35마일로 끝까지 가면 $\frac{d}{35}$ 시간이 걸리고, 이는 데이비드에게 주어진 시간보다 1시간 더 깁니다.

2단계: 실제 이동. 처음 한 시간 동안 35마일을 갑니다. 나머지 $d - 35$ 마일은 시속 $35 + 15 = 50$ 마일로 가므로 $\frac{d-35}{50}$ 시간이 걸립니다. 따라서 실제 이동 시간은 $1 + \frac{d-35}{50}$ 이고, 이는 주어진 시간보다 $\frac{1}{2}$ 시간 짧습니다.

3단계: 비교. 느린 계획은 실제 이동보다 $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ 시간 더 깁니다.

$$\frac{d}{35} - \left(1 + \frac{d-35}{50}\right) = \frac{3}{2}.$$

양변에 350(35, 50, 2의 최소공배수)을 곱하면

$$10d - 350 - 7(d - 35) = 525,$$

즉 $10d - 350 - 7d + 245 = 525$ 이고, $3d - 105 = 525$, $3d = 630$ 이므로 $d = 210$ 입니다.

검산: 시속 35마일로 가면 6시간이 걸리고, 실제 이동은 $1 + \frac{175}{50} = 4.5$ 시간이 걸립니다. 차이는 1.5시간으로, 1시간 늦음과 30분 일찍의 차이와 같습니다. ✓

주의. 처음 한 시간은 두 경우 모두 시속 35마일로 달립니다. 전체를 시속 50마일로 달린 것처럼 $\frac{d}{35} - \frac{d}{50} = \frac{3}{2}$ 로 놓으면 $d = 175$, 선택지 (B)가 나옵니다.

정답: (C) 210

6 정수론

출처: 2017 AMC 10A 16번

말 1, 말 2, ..., 말 10이라는 이름의 말 10마리가 있다. 이 이름은 원형 경주로를 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간(분)에서 따온 것으로, 말 k 는 정확히 k 분 만에 한 바퀴를 돈다. 시각 0에 모든 말이 경주로의 출발점에 함께 있다. 말들은 같은 방향으로 달리기 시작하여 각자 일정한 속력으로 원형 경주로를 계속 돈다.

10마리의 말이 모두 다시 동시에 출발점에 있게 되는 가장 이른 시각 $S > 0$ (분)은 $S = 2520$ 이다. 적어도 5마리의 말이 다시 출발점에 있게 되는 가장 이른 시각을 $T > 0$ (분)이라 할 때, T 의 각 자리 숫자의 합은?

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

핵심 아이디어. 주어진 값 $S = 2520 = \text{lcm}(1, \dots, 10)$ 을 보면 문제를 어떻게 바꿔 읽을지 알 수 있습니다. 말 k 는 정확히 k 의 배수인 시각에 출발점에 있습니다. 따라서 “적어도 5마리가 출발점에 있다”는 “1부터 10까지의 수 중 적어도 5개로 나누어떨어진다”는 뜻이고, 그런 시각 중 가장 작은 것을 구하면 됩니다.

1단계: 바꿔 읽기. 말 k 는 시각 $k, 2k, 3k, \dots$ 에 한 바퀴를 마치므로, 시각 t 에 출발점에 있는 것은 k 가 t 를 나눌 때이고 그때뿐입니다. 따라서 1, 2, ..., 10 중 약수가 적어도 다섯 개인 가장 작은 양의 정수 t 를 찾아야 합니다. (정수 분과 정수 분 사이에는 어떤 말도 출발점에 돌아오지 않으므로 정수만 생각하면 됩니다.)

2단계: 작은 t 확인하기. $\{1, \dots, 10\}$ 에 속하는 약수를 나열하면 다음과 같습니다.

- $t = 6$: 1, 2, 3, 6, 네 마리.
- $t = 8$: 1, 2, 4, 8, 네 마리.
- $t = 10$: 1, 2, 5, 10, 네 마리.
- $t = 12$: 1, 2, 3, 4, 6, 다섯 마리.

12보다 작은 나머지 t 도 이보다 낮지 않습니다. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11은 그런 약수가 많아야 세 개입니다. 따라서 $T = 12$ 입니다.

3단계. T 의 각 자리 숫자의 합은 $1 + 2 = 3$ 입니다.

주의. 말 1은 매분 출발점에 있으므로 다섯 마리 중 하나로 셉니다. 이 말을 빼면 2, ..., 10 중에서 약수 다섯 개를 찾아야 하는데, 이는 24(약수 2, 3, 4, 6, 8)에서 처음 일어나므로 각 자리 숫자의 합이 6, 선택지 (E)가 됩니다.

정답: (B) 3

7 기하

출처: 2016 AMC 10B 17번

수 2, 3, 4, 5, 6, 7을 정육면체의 여섯 면에 한 면에 하나씩 모두 배정한다. 정육면체의 여덟 꼭짓점 각각에 대하여, 그 꼭짓점을 포함하는 세 면에 배정된 세 수의 곱을 계산한다. 이 여덟 개의 곱의 합의 최댓값은?

- (A) 312 (B) 343 (C) 625 (D) 729 (E) 1680

핵심 아이디어. 세 개의 “쌍”에서 인수를 하나씩 골라 만든 여덟 개의 곱의 합은, 세 합의 곱을 전개한 것과 정확히 같습니다. 이 인수분해를 알아차리면 문제는 합이 일정할 때 곱을 최대로 만드는 문제가 됩니다.

1단계: 합을 인수분해하기. 여섯 면을 서로 마주 보는 면끼리 세 쌍으로 나누어 $a_1, a_2; b_1, b_2; c_1, c_2$ 라 합시다. 꼭짓점 하나는 마주 보는 각 쌍에서 정확히 한 면과 만나고(마주 보는 두 면에 동시에 닿을 수는 없습니다), 각 쌍에서 한 면씩 고르는 모든 경우는 한 꼭짓점에서 만납니다. 고르는 경우는 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 가지이고 꼭짓점도 8개입니다. 따라서 여덟 꼭짓점의 곱은 정확히 다음 식을 전개한 여덟 개의 항입니다.

$$(a_1 + a_2)(b_1 + b_2)(c_1 + c_2).$$

2단계: 조건. 세 쌍의 합을 모두 더하면 $2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 27$ 입니다.

3단계: 상한. 합이 일정한 양수들의 곱은 그 수들이 모두 같을 때 가장 큼니다(산술평균-기하평균 부등식). 따라서 $xyz \leq \left(\frac{x+y+z}{3}\right)^3 = 9^3 = 729$ 입니다.

4단계: 실제로 가능함. 2와 7, 3과 6, 4와 5를 서로 마주 보게 놓습니다. 각 쌍의 합은 9이고, 총합은 $9 \cdot 9 \cdot 9 = 729$ 입니다.

따라서 729는 상한이면서 실제로 달성되는 값입니다.

마주 보는 세 쌍의 합만 중요하고, 어느 쌍이 서로 이웃하는지는 상관없다는 점에 주목합니다. 7과 6, 5와 4, 3과 2처럼 균형이 맞지 않게 짝지으면 $13 \cdot 9 \cdot 5 = 585$ 에 그칩니다.

정답: (D) 729

8 대수

출처: 2009 AMC 10A 18번

제퍼슨 여름 캠프에서 어린이의 60%는 축구를 하고, 어린이의 30%는 수영을 하며, 축구를 하는 어린이의 40%는 수영을 한다. 수영을 하지 않는 어린이 중 축구를 하는 어린이는 몇 퍼센트인가? (일의 자리까지 반올림하여 정수 퍼센트로 나타낸다.)

- (A) 30% (B) 40% (C) 49% (D) 51% (E) 70%

핵심 아이디어. 서로 다른 집단에 대한 퍼센트를 한꺼번에 다루기는 까다로우므로, 어린이가 100명인 캠프를 구체적으로 정하고 모든 퍼센트를 사람 수로 바꿔 봅시다. 질문의 “수영을 하지 않는 어린이 중 몇 퍼센트”라는 표현은 분모가 100이 아니라 수영을 하지 않는 어린이의 수라는 뜻입니다.

1단계: 축구를 하는 어린이. 어린이 100명 중 60%가 축구를 하므로 60명입니다.

2단계: 축구를 하면서 수영도 하는 어린이. 그 60명 중 40%가 수영을 하므로 $0.4 \times 60 = 24$ 명입니다. 따라서 축구를 하는 어린이 중 $60 - 24 = 36$ 명은 수영을 하지 않습니다.

3단계: 수영을 하지 않는 어린이. 어린이의 30%가 수영을 하므로 30명은 수영을 하고 $100 - 30 = 70$ 명은 하지 않습니다.

4단계: 비율. 수영을 하지 않는 70명 중 36명이 축구를 합니다.

$$\frac{36}{70} = \frac{18}{35} \approx 0.514,$$

이것을 정수 퍼센트로 반올림하면 51%입니다.

어린이를 100명으로 정해도 잃는 것은 없습니다. 모든 사람 수가 캠프의 크기에 비례하므로, 비 $\frac{36}{70}$ 은 어떤 캠프에서도 같습니다.

주의. 틀리기 쉬운 곳은 분모입니다. 수영을 하지 않는 축구 선수 36명을 전체 어린이 100명으로 나누면 36%, 축구를 하는 어린이 60명으로 나누면 60%가 나옵니다. 둘 다 “수영을 하지 않는 어린이 중 몇 퍼센트”에 대한 답이 아닙니다.

정답: (D) 51%

9 기하

출처: 2016 AMC 10A 19번

직사각형 $ABCD$ 에서 $AB = 6$, $BC = 3$ 이다. 점 E 는 B 와 C 사이에, 점 F 는 E 와 C 사이에 있으며 $BE = EF = FC$ 이다. 선분 $\overline{AE}$ 와 $\overline{AF}$ 가 $\overline{BD}$ 와 만나는 점을 각각 P 와 Q 라 하자.

비 $BP : PQ : QD$ 는 r, s, t 의 최대공약수가 1이 되도록 $r : s : t$ 로 나타낼 수 있다. $r + s + t$ 의 값은?

- (A) 7 (B) 9 (C) 12 (D) 15 (E) 20

핵심 아이디어. 구하는 점은 모두 A 에서 나온 직선이 대각선 $\overline{BD}$ 와 만나는 점이고, $\overline{AD}$ 는 $\overline{BC}$ 와 평행합니다. 평행한 두 선분을 엇갈리는 직선으로 이르면 “나비넥타이” 모양의 닮은 삼각형이 생기고, 이것으로 $\overline{BD}$ 위의 비를 바로 얻습니다.

1단계: 길이. $BC = 3$ 이고 $BE = EF = FC$ 이므로 $BE = 1$, $BF = 2$ 입니다. 또 $AD = BC = 3$ 입니다.

2단계: P 의 위치. $\overline{BE} \parallel \overline{AD}$ 이므로 삼각형 PBE 와 PDA 는 닮음입니다(P 에서 맞꼭지각, B 와 D 에서 엇각). 따라서

$$\frac{BP}{PD} = \frac{BE}{DA} = \frac{1}{3}, \quad \text{이므로} \quad BP = \frac{1}{4} BD.$$

3단계: Q 의 위치. 같은 방법으로 삼각형 QBF 와 QDA 도 닮음이므로

$$\frac{BQ}{QD} = \frac{BF}{DA} = \frac{2}{3}, \quad \text{이므로} \quad BQ = \frac{2}{5} BD, \quad QD = \frac{3}{5} BD.$$

4단계: 세 조각. $PQ = BQ - BP = \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{4}\right) BD = \frac{3}{20} BD$ 입니다. 따라서

$$BP : PQ : QD = \frac{1}{4} : \frac{3}{20} : \frac{3}{5} = \frac{5}{20} : \frac{3}{20} : \frac{12}{20} = 5 : 3 : 12.$$

5, 3, 12의 최대공약수는 1이므로 $r + s + t = 5 + 3 + 12 = 20$ 입니다.

주의. $\frac{BP}{PD} = \frac{1}{3}$ 은 BP 를 대각선 전체가 아니라 PD 와 비교한 것입니다. BP 는 BD 의 $\frac{1}{1+3} = \frac{1}{4}$ 입니다. 또 $\frac{2}{5}BD$ 는 B 에서 Q 까지의 거리이므로, PQ 를 구하려면 BP 를 빼야 합니다.

정답: (E) 20

10 경우의 수와 확률

출처: 2011 AMC 10A 20번

반지름의 길이가 r 인 원의 둘레 위에서 두 점을 서로 독립적으로 무작위로 택한다. 각 점에서 시계 방향으로 길이가 r 인 현을 긋는다. 두 현이 만날 확률은?

- (A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{3}$ (E) $\frac{1}{2}$

핵심 아이디어. 반지름이 r 인 원에서 길이가 r 인 현은 중심과 함께 정삼각형을 이루므로, 항상 60° 의 호를 잘라 냅니다. 회전 대칭성 때문에 첫 번째 현을 고정하고 두 번째 현이 어디에서 시작할 수 있는지만 따지면 됩니다.

1단계: 호. 현과 그 양 끝으로 그은 두 반지름은 세 변이 모두 r 인 삼각형, 즉 정삼각형을 이루므로 중심각은 60° 입니다. 따라서 각 현은 시작점에서 시계 방향으로 이어지는 60° 의 호에 걸쳐 있습니다.

2단계: 첫 번째 현 고정하기. 첫 번째 현이 0° 에서 시계 방향으로 -60° 까지 이어지도록 회전시키고, 이 호를 X 라 합시다. 두 번째 현은 균등하게 무작위로 정해지는 각 θ 에서 시작하여 $\theta - 60^\circ$ 에서 끝납니다.

3단계: 언제 만나는가? 두 현이 만나는 것은 두 번째 현의 한 끝점이 호 X 안에 있고 다른 끝점은 밖에 있을 때이고 그때뿐입니다(원 위에서 두 현의 끝점이 번갈아 놓이는 경우).

- θ 가 X 안에(-60° 와 0° 사이) 있으면, 다른 끝 $\theta - 60^\circ$ 는 -60° 를 지나 X 밖에 있으므로 두 현은 만납니다.
- θ 가 0° 와 60° 사이에 있으면, 시작점은 X 밖에 있지만 끝점 $\theta - 60^\circ$ 는 X 안에 들어가므로 두 현은 만납니다.
- 그 밖의 θ 에 대해서는 두 끝이 모두 X 밖에 있으므로(60° 의 호는 X 를 뛰어넘을 수 없습니다) 두 현은 만나지 않습니다.

4단계. 조건을 만족하는 시작점은 360° 의 원 중 $60^\circ + 60^\circ = 120^\circ$ 를 차지하므로, 확률은 $\frac{120}{360} = \frac{1}{3}$ 입니다.

주의. 두 번째 현이 호 X 위에서 시작하는 경우만 세기 쉬운데, 그러면 $\frac{60}{360} = \frac{1}{6}$, 선택지 (A)가 나옵니다. X 바로 앞에서 시작하여 그 안으로 들어오는 현도 첫 번째 현과 만납니다.

정답: (D) $\frac{1}{3}$