

강남대 약술형논술

수학

목차

2026학년도 인문사회계(A형)	3
문항 9	3
문항 10	4
2026학년도 공학계(B형)	5
문항 4 (자유전공학부 6번 공통)	5
문항 5	6
문항 6 (자유전공학부 7번 공통)	7
문항 7 (자유전공학부 8번 공통)	8
문항 8 (자유전공학부 9번 공통)	9
문항 9 (자유전공학부 10번 공통)	10
문항 10	11
2027학년도 모의논술	12
문항 1	12
문항 2	13
문항 3	14
문항 4	15

2026학년도 인문사회계(A형)

문항 9

[9] 양수 k 에 대하여 함수 $y = \log_2(x + k)$ 가 닫힌구간 $[0, k]$ 에서 최댓값 M , 최솟값 m 을 갖는다. $M - m$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [8점]

■ 예시 답안

함수 $y = \log_2(x + k)$ 는 증가하는 로그함수이다.

$x = 0$ 일 때, 최솟값 $m = \log_2 k$ 를 갖고

$x = k$ 일 때, 최댓값 $M = \log_2 2k$ 를 갖는다.

따라서 $M - m = \log_2 2k - \log_2 k = \log_2 2 = 1$ 이다.

■ 채점 기준

채점 기준	배점
$x = 0$ 일 때, 최솟값 $m = \log_2 k$	4점
$x = k$ 일 때, 최댓값 $M = \log_2 2k = 1 + \log_2 k$ 임을 구할 수 있다.	
$M - m = \log_2 2 = 1$ 임을 구할 수 있다.	4점

문항 10

[10] 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x$ 일 때, 다음 물음에 답하시오. [12점]

- (1) 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 를 구하시오.
- (2) 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하는 과정을 서술하시오.
- (3) 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 구하는 과정을 서술하시오.
- (4) $\int_0^{\sqrt{3}} f(x) dx$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

■ 예시 답안

함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x$ 의 도함수 $f'(x) = x^2 - 1$ 이다.

$f'(x) = x^2 - 1 = 0$ 이 되는 $x = 1, -1$ 이다.

그러므로 $x = -1$ 일 때, 극댓값 $f(-1) = \frac{2}{3}$ 이고

$x = 1$ 일 때, 극솟값 $f(1) = -\frac{2}{3}$ 이다.

$\int_0^{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{3}x^3 - x\right) dx = \left[\frac{1}{12}x^4 - \frac{1}{2}x^2\right]_0^{\sqrt{3}} = -\frac{3}{4}$ 이다.

■ 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	$f'(x) = x^2 - 1$	3점
(2)	$f(-1) = \frac{2}{3}$	3점
(3)	$f(1) = -\frac{2}{3}$	3점
(4)	$-\frac{3}{4}$	3점

2026학년도 공학계(B형)

문항 4 (자유전공학부 6번 공통)

[4] 양수 a ($a \neq 1$)에 대하여 함수 $f(x) = a^{-x} + 2a$ 가 닫힌구간 $[-1, 0]$ 에서 최솟값 2를 갖는다. $a > 1$ 과 $0 < a < 1$ 로 나누어서 a 의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

만약, a 의 값이 존재하지 않으면 그 이유를 간단히 서술하시오. [8점]

■ 예시 답안

$a > 1$ 일 때, $f(x)$ 가 감소하므로 $x = 0$ 에서 최솟값을 가진다.

따라서 $f(0) = a^{-0} + 2a = 2$ 이고 $a = \frac{1}{2}$ 이므로 존재하지 않는다.

$0 < a < 1$ 일 때, $f(x)$ 가 증가하므로 $x = -1$ 에서 최솟값을 가진다.

따라서 $f(-1) = a^{-(-1)} + 2a = 2$ 이고 $a = \frac{2}{3}$ 이다.

■ 채점 기준

채점 기준	배점
$a > 1$ 일 때, $a = \frac{1}{2}$ 이므로 a 가 존재하지 않음을 보일 수 있다.	4점
$0 < a < 1$ 일 때, $a = \frac{2}{3}$ 임을 보일 수 있다.	4점

문항 5

[5] [단답형] 다음 상자 안의 (1), (2), (3)에 알맞은 값 또는 점의 좌표를 쓰시오. [8점]

함수 $f(x) = 4 \tan(\pi + 4x) - 1$ 의 주기는 (1) 이고, $f\left(\frac{\pi}{4}\right) =$ (2) 이다.
 열린구간 $\left(-\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{8}\right)$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 점 (3) 에 대하여 대칭이다.

■ 예시 답안

(1) 함수 $f(x) = 4 \tan(\pi + 4x) - 1$ 의 주기는 $\frac{\pi}{4}$ 이다.

(2) $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 4 \tan\left(\pi + 4 \times \frac{\pi}{4}\right) - 1 = 4 \tan 2\pi - 1 = -1$ 이다.

(3) 열린구간 $\left(-\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{8}\right)$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 열린구간 $\left(-\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{8}\right)$ 에서 그려진 곡선 $y = 4 \tan(\pi + 4x) = 4 \tan 4x$ 의 그래프를 y 축 방향으로 -1 만큼 평행이동한 곡선이다.

곡선 $y = 4 \tan 4x$ 는 원점 $(0, 0)$ 에 대하여 대칭이므로, 곡선 $y = f(x)$ 는 점 $(0, -1)$ 에 대하여 대칭이다.

■ 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	$\frac{\pi}{4}$	2점
(2)	-1	2점
(3)	$(0, -1)$	4점

문항 6 (자유전공학부 7번 공통)

[6] 도함수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = x^2 - 6x$ 의 도함수 $f'(x)$ 를 구하는 과정을 서술하고, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선과 두 점 $(1, f(1)), (6, f(6))$ 을 지나는 직선이 서로 수직일 때, 상수 a 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [10점]

예시 답안

함수 $f(x) = x^2 - 6x$ 의 도함수는

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - 6(x+h) - (x^2 - 6x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2hx + h^2 - 6h}{h} = 2x - 6 \end{aligned}$$

이다. (h 대신 Δx 로 기술해도 가능)

$f(1) = -5, f(6) = 0$ 이므로 두 점 $(1, -5), (6, 0)$ 을 지나는 직선의 방정식은 $y = x - 6$ 이다. (또는 기울기 1)

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선과 $y = x - 6$ 이 수직이므로 $f'(a) = -1$ 이다.

따라서 $2a - 6 = -1$ 이고 $a = \frac{5}{2}$ 이다.

채점 기준

채점 기준	배점
$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - 6(x+h) - (x^2 - 6x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2hx + h^2 - 6h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h - 6) = 2x - 6 \end{aligned}$	4점
$y = x - 6$ 또는 기울기 1만 구해도 됨	3점
$a = \frac{5}{2}$	3점

문항 7 (자유전공학부 8번 공통)

[7] 공차가 d ($d \neq 0$)인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$S_5 = 85, |a_{15}| = |a_{25}|$ 일 때,

첫째항과 공차를 구하는 과정을 서술하시오. [10점]

예시 답안

〈예시 1〉

$S_5 = \frac{5(a_1 + a_5)}{2} = 85$ 이고 $a_3 = \frac{a_1 + a_5}{2}$ 이므로 $a_3 = a_1 + 2d = 17$ 이다.

$d > 0$ 이면 $0 < a_3 < a_{15} < a_{25}$ 이므로 $|a_{15}| = |a_{25}|$ 조건을 만족할 수 없고, 따라서 $d < 0$ 이다.

$a_{15} > a_{25}$ 이며 $|a_{15}| = |a_{25}|$ 이다. 따라서 $a_{15} > 0 > a_{25}$ 이다.

$a_{15} = -a_{25}$ 이므로 $(a_1 + 14d) + (a_1 + 24d) = 2a_1 + 38d = 0$ 이고 $a_1 + 19d = 0$ 이다.

(또는 $a_{15} + a_{25} = 2a_{20} = 0$ 이므로 $a_{20} = a_1 + 19d = 0$ 이다.)

$a_1 + 2d = 17$ 과 $2a_1 + 38d = 0$ 을 연립하여 계산하면 $a_1 = 19$ 이고 $d = -1$ 이다.

〈예시 2〉

$a_n = a_1 + (n - 1)d$ 이고 $a_{15} = a_1 + 14d, a_{25} = a_1 + 24d$ 이다.

$|a_{15}| = |a_{25}|$ 이므로 $|a_1 + 14d| = |a_1 + 24d|$ 이고 서로 다른 부호이다.

$a_1 + 14d = -(a_1 + 24d)$ 이며 $2a_1 = -38d$ 이고 $a_1 = -19d$ 이다.

$S_5 = 85$ 이므로 $d = -1$ 이고 $a_1 = 19$ 이다.

채점 기준

〈예시 1〉

채점 기준	배점
$a_1 + 2d = 17$ 임을 구할 수 있다.	4점
$a_1 + 19d = 0$ 임을 구할 수 있다.	4점
$a_1 = 19, d = -1$ 임을 구할 수 있다.	2점

〈예시 2〉

채점 기준	배점
$ a_{15} = a_{25} $ 이므로 $a_1 = -19d$ 임을 구할 수 있다.	4점
$S_5 = 85$ 이므로 $d = -1$ 이고 $a_1 = 19$ 임을 구할 수 있다.	6점

문항 8 (자유전공학부 9번 공통)

[8] 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \leq a) \\ x & (x > a) \end{cases}, \quad g(x) = \begin{cases} a & (x < a) \\ -x + 3a & (x \geq a) \end{cases}$$

가 있다. 함수 $f(x) + g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 극한값을 갖도록 하는 모든 상수 a 의 값과, 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 상수 a 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [10점]

■ 예시 답안

두 함수 $f(x), g(x)$ 는 $x \neq a$ 에서 연속이므로 $x = a$ 일 때만 확인하면 된다.

$$\lim_{x \rightarrow a-} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a-} (x^2 + a) = a^2 + a$$

$$\lim_{x \rightarrow a+} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a+} (x - x + 3a) = 3a$$

우극한과 좌극한이 같아야 극한값이 존재하므로, $a^2 + a = 3a$ 이고 $a(a - 2) = 0$ 이며 $a = 0, 2$ 이다.

극한값과 함수값이 같아야 연속이므로, $f(a) + g(a) = a^2 + (-a + 3a) = a^2 + 2a$ 이고

$a^2 + a = 3a = a^2 + 2a$ 이다. 따라서 $a = 2$ 일 때 만족하지 않고, $a = 0$ 일 때만 만족한다.

■ 채점 기준

채점 기준	배점
$\lim_{x \rightarrow a-} \{f(x) + g(x)\} = a^2 + a, \lim_{x \rightarrow a+} \{f(x) + g(x)\} = 3a$ 임을 구할 수 있다.	4점
극한값이 존재하기 위해서, $a = 0, 2$ 임을 구할 수 있다.	3점
연속되도록 하는, $a = 0$ 임을 구할 수 있다.	3점

문항 9 (자유전공학부 10번 공통)

[9] 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 는 $\int_{-1}^1 f'(t) dt = 0$ 을 만족시킨다.

함수

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt$$

가 $x = 1$ 에서 극소일 때, 함수 $g(x)$ 는 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 최댓값 M 과 최솟값 m 을 갖는다. 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 그리고 M 과 m 을 구하는 과정을 서술하시오. [12점]

■ 예시 답안

함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 라 하자.

$\int_{-1}^1 f'(t) dt = f(1) - f(-1) = 0$ 이므로, $1 + a + b - (1 - a + b) = 2a = 0$ 이고 $a = 0$ 이다.

$g(x)$ 가 $x = 1$ 에서 극솟값을 가지므로, $g'(1) = f(1) = 0$, $f(1) = 1 + b = 0$ 이고 $b = -1$ 이다.

그러므로 $f(x) = x^2 - 1$ 이다.

따라서 $g(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_0^x (t^2 - 1) dt = \frac{x^3}{3} - x$ 이다.

이 삼차함수 $g(x)$ 는 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 $x = 1$ 일 때 최솟값을 갖고 $x = 2$ 일 때 최댓값을 갖는다.

따라서 최솟값 $m = g(1) = \frac{1}{3} - 1 = -\frac{2}{3}$ 이고, 최댓값 $M = g(2) = \frac{8}{3} - 2 = \frac{2}{3}$ 이다.

■ 채점 기준

채점 기준	배점
$f(x)$ 의 일차항의 계수가 0임을 구할 수 있다.	3점
$f(x)$ 의 상수항이 -1 임을 구할 수 있다.	3점
$g(x) = \frac{x^3}{3} - x$ 임을 구할 수 있다.	2점
$M = \frac{2}{3}, m = -\frac{2}{3}$ 임을 구할 수 있다.	4점

문항 10

[10] 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 양수 k 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $f(x) = 0$ 의 실근은 k 와 $2k$ 뿐이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x)}{x - k} = 9$

$f(4)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [12점]

예시 답안

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 중 조건 (가)를 만족하는 함수는 2가지가 존재한다.

$f(x) = (x - k)^2(x - 2k)$ 또는 $f(x) = (x - k)(x - 2k)^2$ 이다.

$f(x) = (x - k)^2(x - 2k)$ 일 때, 조건 (나)에 대입하여 정리하면

$$\lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x)}{x - k} = \lim_{x \rightarrow k} \frac{(x - k)^2(x - 2k)}{x - k} = \lim_{x \rightarrow k} (x - k)(x - 2k) = 0 \neq 9$$

$f(x) = (x - k)^2(x - 2k)$ 는 조건 (나)를 만족하지 않는다.

$f(x) = (x - k)(x - 2k)^2$ 일 때, 조건 (나)에 대입하여 정리하면

$$\lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x)}{x - k} = \lim_{x \rightarrow k} \frac{(x - k)(x - 2k)^2}{x - k} = \lim_{x \rightarrow k} (x - 2k)^2 = k^2 = 9$$

이고 $k = 3$ 이다.

또는 $f(k) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x) - f(k)}{x - k} = f'(k)$ 임을 구할 수 있고 계산하면 $k = 3$ 이다.

따라서 $f(x) = (x - 3)(x - 6)^2$ 이고 $f(4) = 4$ 이다.

채점 기준

채점 기준	배점
$f(x) = (x - k)(x - 2k)^2$ 임을 구할 수 있다.	6점
$f(x) = (x - k)(x - 2k)^2$ 일 때, $k = 3$ 이고 $f(x) = (x - 3)(x - 6)^2$ 임을 구할 수 있다.	4점
$f(4) = 4$ 임을 구할 수 있다.	2점

2027학년도 모의논술

문항 1

1. 등식

$$4^{\log_2 x} + \log_{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{4} \right)^x + 2^{\log_2 y} = 0$$

을 만족시키는 두 양수 x, y 에 대하여 $x = \alpha$ 일 때, y 가 최댓값 β 를 갖는다. 이때, $\log_{\alpha} \beta$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [10점]

■ 예시 답안

$$4^{\log_2 x} = (2^2)^{\log_2 x} = 2^{2 \log_2 x} = 2^{\log_2 x^2} = x^2 \quad \text{또는} \quad 4^{\log_2 x} = x^{\log_2 4} = x^{\log_2 2^2} = x^{2 \log_2 2} = x^2$$

$$\log_{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{4} \right)^x = \log_{2^{\frac{1}{2}}} (2)^{-2x} = -4x$$

$$2^{\log_2 y} = y$$

이므로 주어진 등식은 $x^2 - 4x + y = 0$ 이고

$y = -x^2 + 4x = -(x-2)^2 + 4$ 이며 $x = 2$ 일 때, 최댓값 4를 가진다.

그러므로 $\alpha = 2, \beta = 4$ 이고

따라서 $\log_{\alpha} \beta = \log_2 4 = 2$ 이다.

■ 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
①	지수, 로그함수의 성질을 이용하여 $y = -x^2 + 4x$ 를 구할 수 있다.	4점
②	$\alpha = 2, \beta = 4$	4점
③	$\log_{\alpha} \beta = \log_2 4 = 2$	2점

문항 2

2. 등비수열 $\{a_n\}$ 이

$$2(a_1 + a_5) = (a_5 + a_9) = 8$$

을 만족할 때, a_9 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [10점]

■ 예시 답안

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라고 하면, $a_5 = ar^4$, $a_9 = ar^8$ 이다.

$2(a_1 + a_5) = 8$ 이므로 $(a_1 + a_5) = (a + ar^4) = 4$ 이다.

$a_5 + a_9 = 8$ 이므로 $ar^4 + ar^8 = 8$ 이고 $r^4(a + ar^4) = 8$ 이다.

$(a + ar^4) = 4$ 를 $r^4(a + ar^4) = 8$ 에 대입하면 $r^4 = 2$ 이다.

$(a + ar^4) = a(1 + r^4) = a(1 + 2) = 4$ 이므로 $a = \frac{4}{3}$ 이다.

따라서 $a_9 = ar^8 = a(r^4)^2 = \frac{4}{3} \times 2^2 = \frac{16}{3}$ 이다.

■ 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
①	$(a_1 + a_5) = (a + ar^4) = a(1 + r^4) = 4$ $r^4(a + ar^4) = 8$	4점
②	$r^4 = 2$	2점
③	$(a + ar^4) = a(1 + r^4) = a(1 + 2) = 4$ 이므로 $a = \frac{4}{3}$ 이다.	2점
④	$a_9 = ar^8 = a(r^4)^2 = \frac{4}{3} \times 2^2 = \frac{16}{3}$	2점

문항 3

3. 함수 $f(x) = x^3 + |x|$ 의 극댓값과 극솟값을 구하는 과정을 서술하시오. [10점]

■ 예시 답안


① $x \geq 0$ 일 때, $f(x) = x^3 + x$ 이고, $x > 0$ 일 때, $f'(x) = 3x^2 + 1$ 이고 $x > 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이므로 $(0, +\infty)$ 에서 증가한다.

② $x < 0$ 일 때, $f(x) = x^3 - x$ 이고 $f'(x) = 3x^2 - 1$ 이므로 $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ 에서 $f'(x) = 0$ 이다.

x	...	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	...	0	...
$f'(x)$	+	0	-	존재 안 함	+
$f(x)$	$\nearrow$	$\frac{2\sqrt{3}}{9}$	$\searrow$	0	$\nearrow$

위 증감표에 의해, $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ 에서 $f'(x)$ 값이 양에서 음으로 바뀌므로 극댓값은 $\frac{2\sqrt{3}}{9}$ 이고, $x = 0$ 에서 연속이고 $f'(x)$ 값이 음에서 양으로 바뀌므로 극솟값은 0이다.

(또는, 증감표가 아닌 그래프 개형으로 설명 가능)



■ 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
①	① $x \geq 0$ 일 때, $f(x) = x^3 + x$ 이고 $f'(x) = 3x^2 + 1$ ($x > 0$)이다. ② $x < 0$ 일 때, $f(x) = x^3 - x$ 이고 $f'(x) = 3x^2 - 1$ ($x < 0$)이다.	3점
②	증감표(또는 그래프 개형)를 이용한 함수 $f(x)$ 의 증감 설명	3점
③	극댓값은 $\frac{2\sqrt{3}}{9}$, 극솟값 0이다.	4점

문항 4

4. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 의 값이 존재한다.

(나) $\int_0^2 f(x)dx = 16 + \int_0^{-2} f(x)dx$

$f(-1) = 6$ 일 때, $f'(1)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [10점]

예시 답안

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 이다.

조건 (가)에 의해, $c = 0$ 이고 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 이다.

조건 (나)에 의해,

$$\int_0^2 f(x)dx - \int_0^{-2} f(x)dx = \int_0^2 f(x)dx + \int_{-2}^0 f(x)dx = \int_{-2}^2 f(x)dx = 16 \text{ 이고}$$

$$\int_{-2}^2 (x^3 + ax^2 + bx)dx = 2 \int_0^2 ax^2dx = \frac{16}{3}a = 16 \text{ 이다.}$$

그러므로 $a = 3$ 이고 $f(x) = x^3 + 3x^2 + bx$ 이다.

$f(-1) = -1 + 3 - b = 6$ 이므로 $b = -4$ 이고 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 4x$ 이다.

$f'(x) = 3x^2 + 6x - 4$ 이므로 $f'(1) = 5$ 이다.

채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
①	$f(x) = x^3 + ax^2 + bx$	2점
②	$a = 3, f(x) = x^3 + 3x^2 + bx$	3점
③	$b = -4, f(x) = x^3 + 3x^2 - 4x$	3점
④	$f'(x) = 3x^2 + 6x - 4, f'(1) = 5$	2점

써봄

기출로 연습했다면, 이제 써보고 바로 첨삭받자.

Google Gemini 기반 한국어 논술 자동 첨삭 서비스

01

4개 영역 점수

논리구조 · 근거타당성 · 주장명확성 · 언어표현 영역별로 점수를 매겨 줍니다.

02

상세 피드백

강점, 개선점, 구체적인 제안사항까지 한 번에 확인합니다.

03

일괄 첨삭

교사·강사는 학생 답안을 최대 10편까지 한꺼번에 올려 처리할 수 있습니다.

04

간편한 업로드

PDF · DOCX · TXT 파일을 그대로 올리면 됩니다.

이용 안내

무료 체험	회원가입 시 3회 무료 분석
개인 플랜	월 9,900원
교사 플랜	월 29,900원

논술 수험생 · 논술 교사와 강사 · 학원과 교육기관



writegrow.net

QR 코드를 스캔하면 바로 시작할 수 있습니다